


## Méfaits de l'usage de substances chez les femmes canadiennes : les décès attribuables à l'alcool

### Chez les femmes canadiennes,



environ 1 décès toutes causes confondues sur 5 était attribuable à l'usage de substances en 2017<sup>1</sup>.

20 % de ces décès étaient attribuables à l'alcool<sup>2</sup>.



Plus de 6 décès attribuables à l'alcool sur 10 étaient associés à des maladies cardiovasculaires et des cancers<sup>3</sup>.



5 816

Nombre total de décès attribuables à l'alcool chez les femmes



36 %



25 %

Plus de 20 % des femmes décédées de ces problèmes de santé avaient 65 ans ou moins.

Ce qui représente environ 3 543 décès évitables



2 076



1 467



C'est près de 10 vies perdues, chaque jour.

# CEMUSC Coûts et méfaits de l'usage de substances au Canada

Estimations produites avec l'outil de visualisation des données CEMUSC [www.CEMUSC.ca](http://www.CEMUSC.ca).

## Le contexte est important!

Les facteurs individuels et sociaux influent sur l'état de santé (p. ex. taux de mortalité attribuable à l'usage de substances chez les Canadiens)<sup>4</sup>.

Ces facteurs doivent être pris en considération au moment d'analyser et d'interpréter les taux de mortalité attribuable à l'usage de substances au Canada.



Expériences vécues pendant l'enfance



Accès aux services sociaux et de santé



Environnement physique



Environnements et soutiens sociaux



Éducation et littératie



Race et culture



Revenu et statut social



Biologie et patrimoine génétique



Emploi et conditions de travail



Genre

<sup>1</sup> Pour estimer la proportion de décès attribuables à l'usage de substances chez les femmes, nous avons divisé le nombre total de décès de femmes rapporté sur le site CEMUSC (28 949) par le nombre total de décès de femmes au Canada en 2017 publié par Statistique Canada (135 591; tableau 13-10-0709-01 de Statistique Canada).

<sup>2</sup> Pour estimer la proportion de décès attribuables à l'alcool chez les femmes, nous avons utilisé des données CEMUSC et divisé le nombre de décès de femmes attribués à l'alcool (5816) par le nombre de décès de femmes attribués à toutes les substances (28 949). Voir l'outil de visualisation des données CEMUSC ([www.cemusc.ca](http://www.cemusc.ca)) pour reproduire nos résultats.

<sup>3</sup> La catégorie « maladies cardiovasculaires » inclut la maladie hypertensive/l'hypertension, les cardiopathies ischémiques, la myocardiopathie alcoolique, les arythmies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques et les varices œsophagiennes. La catégorie « cancer » inclut les cancers de la cavité buccale, du pharynx, de l'œsophage, du côlon et du rectum, du foie, du pancréas, du larynx et du sein. Pour en savoir plus, voir le rapport du [Groupe de travail scientifique sur les coûts et les méfaits de l'usage de substances au Canada](#) (2020).

<sup>4</sup> Pour plus de renseignements sur l'influence des déterminants sociaux de la santé sur l'état de santé, voir la page [Déterminants sociaux de la santé et inégalités en santé](#).